your health in your hands



MODE D'EMPLOI

Suivez les étapes pour réaliser vos prélèvements en toute simplicité et sérénité



INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS AVANT DE COMMENCER



SÉLÉCTIONNER VOTRE LANGUE

QUAND RÉALISER CES TESTS?

- Tous les prélèvements sont à faire en 48h maximum du dimanche au mercredi
- Le cycle du Cortisol le premier jour, et le second jour (jour du ramassage DHL)
- Faire les autres prélèvements (le matin de préférence)

ATTENTION POUR DES RAISONS DE TRANSPORT :

Ne pas faire votre test après le jeudi midi , le weekend, ni la veiille ou l'avant veille d'un jour férié



ATTENTION

- NE PAS EFFECTUER
- ces tests si vous vous sentez faibles
- SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS BIEN

pendant les prélèvements, veillez à contacter un médecin ou contactez les urgences en cas de malaise

- L'INTÉGRALITÉ
 des prélèvements (hors
 Cortisol) dure 30min
- AVANT CHAQUE TEST nettoyez-vous les mains



01. Enregistrer votre kit

Accèder à votre profil <u>Bodycheckup.com</u>, cliquer sur "enregistrer mon kit", renseigner le numéro unique de votre Kit commençant par BCU disponible sur votre "personal card code" (flyer bleu) ou sur le côté de votre kit et suivre les étapes.

LES ÉTAPES CLEF

ATTENTION:

Enregistrer votre kit avant de commencer les prélévements, nous ne pourrons pas analyser vos prélévements si vous n'êtes pas enregistré.



02. Collecter vos prélèvements

Remplir votre carte personelle (9) et placer la dans la boite de retour (9)

Suivre les étapes dans le manuel pour réaliser vos tests dans les meilleurs conditions, vous pouvez retrouver une video explicative sur chacun des tests ainsi que nos recommendations et la liste du matériel.




03. Envoyer vos prélèvements

Bien réaliser le test du cycle du Cortisol (page 8), et prendre rendez-vous avec DHL (mydhl.express.dhl) la veille des autres prélèvements.

Pour organiser le retour de vos échantillions vers le laboratoire, retrouvez toutes les informations page 20.

つ



MATÉRIEL **DANS VOTRE KIT**

- Étapes pour enregistrer votre kit BodyCheckup sur le site www.bodycheckup.com
- Tube pour le prélèvement salivaire et buccal
- 3 Coton-tige pour le prélèvement salivaire et buccal
- 5 tubes pour les prélèvements salivaires sans coton-tige
- Orcode pour suivre les instructions en vidéo

- 6) 1 tube pour les prélèvements des selles (vide)
- (6bis) 1 tube pour les prélèvements des selles (plein)
- 7 Tube pour le prélèvement urinaire
- 3 lancettes pour les prélèvements sanguins (laisser fermer les bouchons jusqu'au moment du prélèvement sanguin)
- 9) 2 tubes pour les prélèvements sanguins
- Boîte pour renvoyer vos prélèvements



MATÉRIEL **DANS VOTRE RETURN BOX**

- Boîte pour renvoyer vos prélèvements
- 2 pochettes de transport
- 2 pansements
- (13) Safety bag
- (14) Collecteur d'urine
- Pipette en plastique (urine)

- 2 compresses désinfectantes
- (17) 2 compresses
- 18) 4 minivettes
- 19) Votre carte personnelle à renvoyer
- 20) Collecteur de selles



TEST SALIVAIRE

cycle du cortisol



5 tubes sont prévus, numérotés de 1 à 5. Déposer votre salive dans 5 tubes en respectant les horaires de prélèvement.

L'OUVERTURE PEUT ÊTRE DIFFICILE, TIRER VERS LE HAUT POUR OUVRIR LES TUBES.





ATTENTION

• RECUEILLIR

de la salive pure non contaminée par des crachats ou des saignements de gencive

- NE VOUS LAVEZ les dents qu'après le second prélèvement
- PRENDRE RDV avec DHL le jour du prélèvement de ce test



Le matin au réveil, dans le tube 1



Le matin 30 min après le réveil, dans le tube 2



À 12PM, dans le tube 3







RETROUVER LE PRÉLÈVEMENT EN VIDÉO

IMPORTANT!

SILE PRÉLÈVEMENT VOUS PARAÎT ROSÉ, IL EST CONTAMINÉ ET DONC PAS UTILISABLE. RINCER LE TUBE À L'EAU CLAIR ET REFAIRE LE PRÉLÈVEMENT.



TEST SALIVAIRE FUT 2



Les prélèvements se font à l'aide du coton-tige.

> RESPECTER LES TEMPS INDIQUÉS DE FROTTEMENTS AFIN DE RÉALISER LE TEST AU MIEUX.





ATTENTION

- NE PAS MANGER, boire, fumer ou mâcher du chewing-gum 30 minutes avant de prélever l'échantillon de salive
- NE PAS VIDER le liquide présent dans le tube



01Ouvrir l'emballage stérile et sortir le coton-tige ③



> 02 Introduire le coton-tige dans votre bouche et frotter l'intérieur des joues pendant 30 secondes



> 03
Après prélèvement,
transférer le coton-tige dans
le tube réservé ②
et casser la tige à hauteur de
la cassure indiquée en rouge.
La partie qui a servi au
prélèvement reste dans le tube



> **04**Ne pas oublier de bien fermer le tube



NE PAS TOUCHER LE BOUT DU COTON-TIGE AVEC LES DOIGTS



RETROUVER LE PRÉLÈVEMENT EN VIDÉO

10



TEST URINAIRE





Remplir jusqu'au trois quart le tube numéro 7

LE RÉCEPTEUR D'URINE EST PRÉVU POUR VOUS AIDER À REMPLIR LE TUBE.





ATTENTION

- NE PAS RINCER le réceptacle
- PRÉLEVER la <u>première urine</u> du matin ou du milieu de la nuit
- PRÉLEVER DANS votre douche, votre baignoire ou au-dessus de vos toilettes de préférence



Urinez directement dans le tube numéro 🗇 ou uriner dans le collecteur d'urine 14



> 02

Si vous urinez dans le collecteur d'urine : après le prélèvement, versez votre urine récoltée dans le tube numéro ① ou utiliser la pipette ⑤ pour transvaser votre urine du collecteur au tube



Dès que le tube est rempli au 3/4, ne pas oublier de bien fermer le tube





RETROUVER LE PRÉLÈVEMENT SN VIDÉO



TEST **SELLES**



6



(20)

Prévoir les deux tubes dédiés au prélèvements des selles : tube 6 et avant de vous rendre aux toilettes

LES BOUCHONS DES TUBES SONT MUNIS DE PETITES CUILLIÈRES POUR RÉALISER LE TEST. REMPLIR LA PETITE CUILLÈRES EST SUFFISANT POUR L'ANALYSE (IL NE FAUT PAS LES DÉTACHER).





ATTENTION

- EN DEHORS

 de toute antibiothérapie
 (environ 2 semaines avant)
- NE PAS MODIFIER vos habitudes alimentaires
- NE PAS UTILISER
 un suppositoire, ne pas
 prendre de laxatif, ne pas
 prendre un médicament
 ralentisseur de transit tel
 que l'Imodium®, Smecta®
 24h avant
- NE PAS VIDER
 le liquide présent dans le tube



> 01

> 04

détacher

Placer le collecteur de selles @ sur le rebord de vos toilettes. Déposer vos selles

Avec le deuxième tube,

prélever un échantillon de selles

à l'aide de la cuillère fixée sous

le bouchon du tube ⑥ sans la



> 02

Prélever un échantillon de selles à l'aide de la cuillère fixée sous le bouchon du tube ⊜ sans la détacher. Remplir la cuillère suffit (pas des selles diarrhéiques); la cuillère contenant les selles est immergée dans le liquide et le flacon doit être refermé hermétiquement



> 05

Ne pas oublier de bien fermer le tube



03

Ensuite, retourner le tube pendant environ 15 secondes, sans secouer, afin que les selles soient bien imprégnées et restent immergées dans le tube. Bien fermer le tube

IMPORTANT!

L'ÉCHANTILLON NE DOIT PAS TOUCHER L'INTÉRIEUR DES TOILETTES / RECUEILLIR LES SELLES (SANS URINES)



EN VIDÉO

14

1



16

TEST SANGUIN











Boire de l'eau 30 min avant. Se laver les mains 3 min sous l'eau chaude pour faciliter la circulation. Privilégier l'annulaire.





ATTENTION

 ACTIVER votre circulation sanguine en restant en mouvement

 HÉMATOPHOBES, n'hésitez pas à demander à un de vos proches de vous piquer le doigt

• NE PAS EFFECTUER ce test si vous vous sentez faible

• Cela peut-être un peu DOULOUREUX



Préparer les éléments nécessaires sur une table. poser le doigt destiné à la pigûre sur la table. Le désinfecter avec la compresse désinfectante 🙃



> 05

Poser le tube (9) ouvrir le bouchon, introduire la minivette (18) Puis appuyer sur la valve violette pour verser le sang dans le tube.

Une fois la valve appuyée la minivette n'est pas plus utilisable



> 02

Ouvrir la lancette ® destinée à piquer votre doigt en tournant le bouchon. Poser la lancette ouverte sur votre doigt et appuyez fermement. Nettoyer la première goutte de sang avec la compresse désinfectante, et masser votre doigt pour activer le sang



Répéter ces actions avec les minivettes restantes plusieurs jusqu'à remplir le premier tube à 1ml puis le deuxième tube. Désinfecter vous ensuite le doigt avec la compresse restante (17)



> 07

Vous pouvez verser le sang directement dans le tube 4 où à l'aide des minivettes 🐵 placer le bout de cette dernière sur votre goutte de sang de facon horizontale, récolter le sang de votre doigt.

Ne pas bloquer l'arrivée d'air sur la valve violette avec votre doigt



Appliquer la compresse sur la goutte, nettoyer le sang et appliquer le pansement 😥



> 04

Remplir la minivette avec votre sang

IMPORTANT!

VOUS POUVEZ RESSENTIR UNE DOULEUR PENDANT PLUSIEURS JOURS. SI ELLE PERSISTE, CONTACTEZ VOTRE MEDECIN.



QUAND TOUS LES TUBES SONT REMPLIS AVEC LA QUANTITÉ SUFFISANTE

IMPORTANT!

LE TICKET DHL SE TROUVE DANS L'ENVELOPPE BODYCHECKUP DISPOSÉ SUR VOTRE KIT À L'OUVERTURE.



> 01

Placer la votre carte personelle @ dans la "Return Box" @



> 02

S'assurer de placer tous les tubes dans les 2 pochettes de transport @



> 03

Placer ces deux enveloppes remplies de vos tubes dans le "Safety Bag" (1)



Fermer votre "Safety Bag" et placer le dans la "Return Box"



05

Fermer la "Return Box" à l'aide de l'autocollant 3mm et placer la dans une pièce à température ambiante (attention de ne pas l'exposer au soleil)



) 06

Coller votre ticket DHL au dos de votre "Return Box "





POUR ENVOYER **VOS ÉCHANTILLONS**

- Merci d'utiliser le bon DHL prépayé à coller sous votre « Return Box » 19
- Retrouver le code d'enregistrement d'envoi commençant par : WAYBILL sur le bon DHL ou directement sur votre compte Bodycheckup
- Rendez-vous sur MYDHL.EXPRESS.DHL





- PRENDRE RDV sur DHL au minimum 24H avant de faire vos prélèvements
- NE PAS ENVOYER les échantillons après le jeudi midi, le weekend ni la veille ou avant veille d'un jour férié
- NE RIEN PAYER À DHL le transport est prépayé



Puis, se connecter sur mydhl.express.dhl et sélectionner votre emplacement

Une fois sur mydhl.express.dhl, dans la barre de menus supérieure, - Cliquer sur le bouton "Expédier". - Puis sur "Prévoir un ramassage"

À la question "Vous avez besoin de créer une étiquette d'expédition?"

Répondre "NON"

Entrer votre numéro d'expédition qui apparaît sous le premier code barre (sans écrire WAYBILL), puis

- Cliquer sur "Suivant"

> 05

Remplir les détails de l'adresse de ramassage et

- Cliquer sur **"Suivant"**
- Spécifier les informations du paquet (Poids: 0.3kg / Taille: 24x12x5cm)
- Cliquer sur "Suivant"

Indiquer l'heure de disponibilité à laquelle vous voulez que le chauffeur prenne le colis, puis

- Cliquer sur "Planifier le ramassage"

20



Suivez vos prélèvements sur votre compte personnel

www.bodycheckup.com

À bientôt.

























_ Corning Gosselin SAS, 123 route de Caestre, Borre - CS40019 59529 Hazebrouck Cedex, France _ SARSTEDT AG & Co.KG - Sarstedtstr. 1, D-51588 Numbrecht, Germany, info@sarstedt.com. +49 (0)2293 305-0

Bector, Dickingson and Company Limited, Pottery Road, Dun LoaghaireCo, Dublin, Ireland, vacutainer_techservices@bd.com, +1 800 631 0174

DESCRIPTION	Minivette-POCT-200µl-K3E	Feaces-tubes	Fingers-prickers	Grauduate-H230-with-caps	Pots	Bouchons
REF	17.2113.201	80.734.301	366594	F2000-02	58.487	65.790
LOT	1074821	1094121	B7H92M9	803212	7380	1306012
Ω	30/11/2024	N-A	30/09/2026	N-A	N-A	N-A

INFORMATION MÉDICALES : SI VOUS AVEZ DES CONTRES INDICATIONS AYANT RAPPORT AVEC NOS TESTS, MERCI DE CONTACTER VOTRE MÉDECIN TRAITANT AVANT DE RÉALISER LE TEST

Après avoir terminé toutes les étapes, vous pouvez vous attendre à un résultat dans les 3-4 semaines.

Télécharger l'application **Body Checkup** pour suivre votre échantillon.



Body CheckUp

SURVENT

> Ne pas oublier que nous aurons besoin de vos questionnaires remplis afin de traiter vos résultats et les recommandations des médecins.

BESOIN D'AIDE?

CONTACT@BODYCHECKUP.COM OÙ SUR NOTRE PAGE QUESTION SUR

